

MANEJO

Abonado: se recomienda 20 kg/ha sembrada el primer año.

Siega: química dejando una línea central para la producción de semillas, o con desbrozadora mecánica una vez que se haya producido la maduración de las semillas.



www.cuvren-olivar.es



info@cuvren-olivar.es

MIEMBROS



COLABORAN



SÍGUENOS EN



#CUVrEN_OLIVAR



**CUBIERTAS VEGETALES DE ESPECIES NATIVAS
EN OLIVAR**

GUÍA DE USO



Inversión subvencionada con fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

LAS CUBIERTAS VEGETALES EN LOS CULTIVOS LEÑOSOS

- Disminuyen la escorrentía y aumentan la retención en agua en el suelo
- Aportan rastrojo que evita el impacto de la gota sobre el suelo desnudo
- Ayudan a la retención de los nutrientes en el suelo y disminuyen la contaminación de las aguas por arrastre de fitosanitarios y fertilizantes
- Aumentan la recirculación de nutrientes desde los perfiles más profundos a los superficiales
- Favorecen el incremento de materia orgánica en el suelo, la microbiota y la fertilidad edáfica
- Recuperan la biodiversidad en el cultivo y con ello la presencia de insectos auxiliares para el control biológico de las plagas
- Ayudan al cumplimiento de las exigencias medioambientales de la PAC

Las cubiertas herbáceas son el sistema más eficaz para favorecer la sostenibilidad del olivar al menor coste

POR QUÉ SEMILLAS NATIVAS

Las semillas nativas elegidas para la creación de cubiertas en los olivares responden a las siguientes características:

- Germinan a comienzos del otoño a un amplio rango de temperaturas
- Solo necesitan preparación superficial del suelo
- Desarrollan un ciclo vegetativo muy corto, secándose de manera natural a final de la primavera
- Se adaptan a cualquier tipo de suelo
- Poseen alta rusticidad con mínimas necesidades hídricas y nutricionales
- Alta producción de semilla y autosiembra natural. Solo han de ser sembradas un año.



QUÉ SON LAS SEMILLAS NATIVAS: son especies autóctonas herbáceas elegidas por su aplicación en la restauración de agroecosistemas, paisajismo, conservación del medio ambiente, etc.

DE DÓNDE PROCEDEN: se producen mediante cultivo a partir de poblaciones naturales locales por métodos agronómicos y tecnológicos para mantener su diversidad

SON MEZCLAS DE CONSERVACIÓN: no son variedades comerciales importadas, sino mezclas de especies y poblaciones naturales y autóctonas.

INSTALACIÓN

La instalación de las cubiertas de especies nativas debe realizarse siguiendo las siguientes recomendaciones prácticas:

- Preparación del suelo muy superficial: solo necesita un pase de cultivador superficial para descompactar
- Fecha de siembra recomendada: otoño, tras las primeras lluvias, respetando el tránsito de maquinaria durante la nascencia
- Distribución de la siembra: mediante sembradora de cereales en curvas de nivel de 2 metros de ancho.
- Densidad de siembra: 20 kg/ha

